

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。



湿疹、あせも、皮ふのただれに
非ステロイド性 皮ふ疾患治療薬 **コーフルS** (軟膏) 医薬品
チューブ入

コーフルSは、すぐれた殺菌力があるアクリノールと、被膜を作り傷口を乾燥させる酸化亜鉛の2つの有効成分に、皮ふ組織の活性を高め、新陳代謝を活発にするビタミンA、D₂、B₆、Eを配合し、スクワランなど4つの基剤を用いた皮ふ疾患を治す軟膏です。また、油脂性基剤を使用しているので傷口からガーゼがはがれやすく、ガーゼ、包帯の交換も痛まずにできます。あかちゃんはもとより、ご家族みなさまの皮ふ疾患の手当てにお役にてください。

こんなときに

●乳幼児の



湿疹、あせも、
皮ふのただれ、
肛門周囲炎

●小さな子の



湿疹、あせも、
口唇周囲炎、
すり傷、外傷

●お母さんの



湿疹、やけど、
くつずれ、乳ぎれ

●高齢の方の



床ずれ、
皮ふのただれ

●その他

凍傷にも

4つの基剤の特長

- スクワラン 深海にすむサメの肝臓から抽出した油で、薬剤の浸透性に優れ皮ふの保護力を高めます。
オリーブ油 もくせい科常緑樹オリーブの熟した果実から得られ、皮ふを保護します。
白色ワセリン 外気や物と皮ふが触れないように遮断し水分の蒸散を防ぐので傷の部分を守ります。
セタノール 保湿効果がある親水性の軟膏基剤です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

飲んだり、眼科用として使用しないでください。

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 今までに、薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 患部が広範囲の人
- (3) 溼潤やただれのひどい人
- (4) 深い傷やひどいやけどの人
- (5) 医師の治療を受けている人

2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等

(2) 数日間、使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

湿疹、汗疹、汗疹（あせも）、皮ふのただれ、床ずれ、肛門周囲炎、口唇周囲炎、胴帯脱着後のただれ、くつつれ、やけど、すり傷、外傷、乳ざれ、会陰裂傷、凍傷

用法・用量

1日1回～数回、患部に塗布又は貼用する。

●用法・用量に関する注意

- (1) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合は眼科医の診察を受けてください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 定められた用法・用量を守ってください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

成分（100g中）

成分	含量	はたらき
アクリノール	500mg	黄色ブドウ球菌をはじめ、化膿レンサ球菌、その他化膿菌全般による化膿局所の消毒、静菌作用があります。
酸化亜鉛	5000mg	皮ふのたんぱく質と結合して被膜をつくるので、消炎作用、緩和な防腐作用があります。また、浸出液の吸収及び分泌抑制により、創面などを乾燥させます。

添加物としてビタミンA油、エルゴカルシフェロール、シバルミチン酸ピリドキシン、トコフェロール、dl-カンフル、スクワラン、オリーブ油、白色ワセリン、セタノール及び香料を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (2) キャップをしっかり締めて直射日光の当たらない、なるべく涼しい所に保管してください。
- (3) 誤用を避け品質を保持するために他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 衣服等に付くと着色しますので、ご使用の際は十分に注意してください。

お問い合わせ先

大木製薬株式会社 お客様相談室 03-3256-5051

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）



発売元
大木製薬株式会社
東京都千代田区神田鍛冶町3-3
<http://www.ohkiseiyaku.com>

製造販売元
協和新薬株式会社
埼玉県草加市小山1丁目28番8号