

この説明文書は、本剤を服用する前に、必ずよく読んでください。
また、必要な時に訪めるように大切に保管してください。

解熱鎮痛薬 **セブスキット** 医薬品

イブプロフェン配合錠剤

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
(1)本剤による過敏症状（発疹・発赤、かゆみ、浮腫等）を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
(3)15歳未満の小児。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります)
4. 服用時は飲酒しないでください
5. 長期連用しないでください

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、又は薬剤師に相談してください
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)授乳中の人。
(4)高齢者。
(5)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6)薬によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7)次の診断を受けた人。
心臓病、腎臓病、肝臓病、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病
(8)次の病気ににかかったことのある人。
胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン氏病（腸の炎症）
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください
(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃痛、胃部不快感、口内炎
精神神経系	めまい
その他	目のかすみ、耳なり、むくみ

- (2)まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさなどがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエルの症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。
腎障害	尿量が減り、全身のむくみ及びこれらに伴って悪寒しさ、だるさ、悪心・嘔吐、血尿、蛋白尿等があらわれる。
薬剤性髄膜炎	首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、悪心・嘔吐等の症状があらわれる。(このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。)
ぜんそく	

- (3)5～8回服用しても症状がよくなる場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください
便秘、下痢

【効用・効果】

- 頭痛・歯痛・生理痛・咽喉痛・関節痛・筋肉痛・神経痛・腰痛・肩こり痛・捻挫後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛
- 熱寒・発熱時の解熱

【成分・分量】 2錠中

成分	含量
イブプロフェン	150mg
アリルイソプロピルアセチル尿素	60mg
無水カフェイン	80mg

添加物：乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、結晶セルロース、CMC、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、酸化チタン、カルナウバロウ


【用法・用量】

なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1日量	1日服用回数
大人(15歳以上)	2錠	3回を限度とする
15歳未満の小児	服用しないこと	

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)錠剤の取り出し方

図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。



(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)

【保存および取り扱い上の注意】

- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
- (2)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店または下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

三友薬品株式会社 消費者相談窓口 電話03-3699-9333
受付時間 午前9:00～午後5:00(土・日・祝日を除く)

発売元 **大木製薬株式会社**
東京都千代田区神田御油町3-3

製造販売元 **三友薬品株式会社**
東京都足立区墨江1-9-14