

この説明文書は、服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように保存してください。

医薬品 乗物酔い薬

6歳

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防に

★ **トリブラサイム**

飛行機・船・夜行バスなど長距離の旅行に



乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防に

飛行機・船・夜行バスなど
長距離の旅行に

薬の効き方と特長

交通機関の発達とともに、どうしても乗物に乗らなければならない機会が増えていきます。しかし乗物酔いの苦しみを知っている人にとっては、自動車や船に乗ると聞いただけで、「気分が悪くなったらどうしよう」とまず考えるものです。また普段は自分で車の運転をする人でも、他人の車に乗れば、気分が悪くなることもあります。トリブラサイムは、このような乗物酔いに対して開発された医薬品です。また、めまいや吐き気、頭痛の予防になるように適量の成分が配合されています。日常生活において、目や耳に感じた感覚は脳の脳皮質に神経の刺激として伝わり、気分が悪くなったり、嘔吐などの症状を起こさせます。トリブラサイムに含まれているプロモバルビル尿素は、脳や嘔吐中枢の神経を強力に抑える(鎮める)働き、つまり、鎮静作用をもった医薬品です。抗ヒスタミン剤のケロルフェニラミンマレイン酸塩は、中枢神経抑制作用のあるプロモバルビル尿素と同時に服用することにより、プロモバルビル尿素の働き目を更に高める働きがあります。

お問い合わせ先

大木製薬株式会社 TEL 03-3256-5051
受付時間9:00～17:00(土、日、祝を除く)

発売元 **大木製薬株式会社**
東京都千代田区神田錦町3-3

製造販売元 **日野薬品工業株式会社**
滋賀県彦根市日野町上野野119

S0610A

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の薬物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮痙去痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(酔気あらわれることがあります。)
3. 服用時は飲酒しないでください。

👨‍⚕️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。アレルギー
(6) 次の診療を受けた人。緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状	関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	その他	損傷困難

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。
口のかわさ

【効能又は効果】

薬物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

【用法及び用量】

15歳以上…1日1回1錠を服用してください。

ただし、薬物酔いの予防には、乗車前30分前に服用してください。

【用法及び用量に関連する注意】

本剤は、15歳未満の小児に服用させないでください。

【成分及び分量】1日量(1錠)中

プロモレリル尿素-150mg

クロルフェニラミンマレイン酸塩-2mg

添加物としてセルロース、クロスカルメロースNa、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、タルク、硬化油を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 服用後は暑くなりますので乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 服用に際しては、説明文書をよく読んでください。
- (4) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。