

# 第3類医薬品

[販売名]

## タチカラ電解カルシウム 600mL

### 使用上の注意

#### 【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
●医師の治療を受けている人
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
●便秘
3. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 効能・効果

カルシウム不足・栄養補給を目的としたカルシウムの補足・授乳期および小児発育期のカルシウム補給源

### 用法・用量

成人は1日量40mLを3回にわけて空腹時に服用します。小児は成人の半量です。

#### 【用法・用量に関する注意】

- (1)服用前はお茶を飲まないでください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導のもとに服用させてください。
- (3)定められた用法・用量を守ってください。

### 成分・分量

本品は100mL中、カルシウム[Ca<sup>++</sup>]として、80mgを含有しています。

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)服用後は密栓し、冷蔵庫に立てて保管してください。
- (3)液はなるべく振らないでください。
- (4)添付の計量カップは、ご使用のつど水洗いなどして常に清潔に保管してください。
- (5)本品を使用中、ビン口のまわりが白くなることがあります。これは空気により酸化されたカルシウム結晶ですので、服用には差し支えありません。
- (6)小児の手の届かないところに保管してください。
- (7)誤用の原因になったり品質が変わることがありますので、他の容器に入れ替えないでください。
- (8)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

0120-149-931 (フリーダイヤル)

# 第3類医薬品

## 吸収のよいイオン化された タチカラ電解カルシウム 600mL

タチカラ電解カルシウムは、吸収のよい、良質のカルシウム製剤です。私たちのからだにとって、カルシウムは必要不可欠のものであり、骨格の主要成分です。この重要なカルシウムが、私たち日本人に、ともすれば不足がちなのは注意を要することです。

例えば、カルシウムを豊富に含む海藻や野菜を摂っても、食物中のシウ酸やフィチン酸と結合するとカルシウムが不溶性になり、体内に吸収されません。カルシウムは、イオンとして吸収されてはじめて効果が現れるのです。

タチカラ電解カルシウムは、イオン化されたカルシウムです。無臭無色でpH11~13のアルカリ性の水溶液でカルシウムイオンによる特徴のある味をわずかに感じさせます。

吸収がよく、カルシウム補給に効果があります。

発売元

 大木製薬株式会社

東京都千代田区神田鍛冶町3-3 大木ビル7F

お問い合わせ TEL.03-3256-5051

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元

 森田薬品工業株式会社

広島県福山市大門町野々浜105番地