

プラセンVX  
PLACEN



第2類医薬品 50mL

【販売名】プラセンVX

【使用上の注意】

【相談すること】

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

かゆみ、発疹の症状があらわれた場合、又は生理に異常を感じられた時

2.しばらく服用しても症状がよくなる場合、又は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】

本品50mL(1日量)中

胎盤加水分解物……………1.5mL

チアミン硝化物……………5mg

リポフラビンリン酸エステル

ナトリウム……………6.85mg

(リポフラビンとして5mg)

ピリドキシン塩酸塩……………5mg

ニコチン酸アミド……………20mg

無水カフェイン……………50mg

【アルコール0.15mL以下】

添加物としてクエン酸、DL-リンゴ酸、果糖、ブドウ糖、バラベン、香料を含む。

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体的疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給。

【用法・用量】

大人1日1回1瓶(50mL)を服用してください。

- 定められた用法・用量を守ってください。
- 本剤は沈殿を生じることがありますが効果には支障ありません。よく振って服用して下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

【発売元】

 大木製薬株式会社

〒101-0045東京都千代田区神田鍛冶町3-3  
お問い合わせ TEL 03-3256-5051  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

【製造販売元】

ピタエックス薬品工業株式会社

〒612-8418京都市伏見区竹田内代町7番地  
TEL 075-691-1671(代表)

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/>  
TEL 0120-149-931