

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

プラセンタ製剤

第2類医薬品

ユースP糖衣錠

ユースP糖衣錠は、胎盤を化学的に処理してえられる加水分解物と、乾燥させた微粉末の混合物にビタミンB1類（チアミンジスルフィド）を加え服用を容易にした製剤であります。

豊富な蛋白質と吸収され易い各種アミノ酸、それにビタミンB1類を含んでおり、滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給などにすぐれた効果をあらわします。

使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	かゆみ、発疹
そ の 他	生理異常





2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔効能・効果〕

15才以上 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給。

5才～14才 滋養強壮、虚弱体質、病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給、偏食児・幼小児の発育期などの栄養補給。

〔用法・用量〕


年齢	15才以上	11才以上15才未満	5才以上11才未満	5才未満
1 回量	3錠 	2錠 	1錠 	服用させないこと 
服用回数	1日3回			

裏面もお読みください

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)本剤は5才未満の乳幼児に服用させないでください。

〔PTP包装の場合の錠剤のとり出し方〕



突き出た透明な部分を指先でアルミ箱の方へ押しすと、アルミ箱が破れて錠剤が出てきます。

誤って、そのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります。

〔成分・分量〕 本品9錠（1日量）中

胎盤加水分解物	0.54mL
胎盤乾燥微粉末	750mg
チアミンジスルフィド	18mg

添加物として乳糖、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、アラビアゴム、ゼラチン、白糖、マクロゴール、タルク、炭酸Ca、黄色5号、赤色3号、カルナウバロウを含む。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

日々の健康は薬だけではなく、日々の養生が大切な要因となります。
規則正しい生活を守るようにしてください。

お問い合わせ先

大木製薬株式会社

電話：03-3256-5051

受付時間：9時から17時まで

(土、日、祝日を除く)

発売元



大木製薬株式会社

東京都千代田区神田鍛冶町3-3

製造販売元

ビタエックス薬品工業株式会社

京都市伏見区竹田向代町7番地

副作用被害救済制度の間合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/>

電話 0120-149-931